

## Loogikafunktsiooni NUMBRILINE 10ndESITUS

**10ndesitus** on loogikafunktsiooni kompaktnes esitusviis, kus tõeväärtustabel mahutatakse ära "ühele reale" (võttes appi **10ndarvud**)

Funktsiooni kolmest võimalikust *piirkonnast* :

**0**

**1**

**määramatus** seda tähistatakse tõeväärtustabelis *kriipsuga* : —

....näidatakse **10ndesitus**es ära tavaliselt **2 piirkonda** (kolmest)

**3**-muutuja funktsiooni **10ndesitus** sisaldab **10ndarve 0 .....** **7**

**4**-muutuja funktsiooni **10ndesitus** sisaldab **10ndarve 0 .....** **15**

**5**-muutuja funktsiooni **10ndesitus** sisaldab **10ndarve 0 .....** **31**

..... ehk üldiselt :

**n**-muutuja funktsiooni **10ndesitus** sisaldab **10ndarve 0 .....** **(2<sup>n</sup> - 1)**

ülesanne: ----- \



Leida **Karnaugh' kaardiga MDNK** ja **MKNK** (osaliselt määratud) 4-muutuja loogikafunktsioonile:

$$f(x_1 \dots x_4) = \prod(1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15)_0 (3, 14)_-$$

Tuvasta, kas leitud *normaalkujud* on **omavahel loogiliselt võrdsed** :

ehk kas **MDNK = MKNK ?**



....kanname **10ndesituse 4-muutuja Karnaugh' kaardile** :

$$f(x_1 \dots x_4) = \prod(1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15)_0 (3, 14)_-$$

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

.... selle funktsiooni **tõeväärtustabeli paiknemine 4-muutuja kaardil** :

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

**MDNK** ja **MKNK** leidmised on teineteisest sõltumatud ja nad võib leida ükskõik kumbas järjekorras. **MDNK** leidmisel tehtud valikud / otsused ei mõjuta järgnevat **MKNK** leidmist (ja vastupidi).

Leiame esimesena **MDNK**

**! DNK** saadakse alati loogikafunktsiooni **1de piirkonnast !**

ehk : kontuuridega tuleb kaardil katta **1**-de ruudud

## Kontuuride valimise reeglid

- Katame kaardil asuvad 1-de ruudud suurimate kontuuridega, kasutades seejuures võimalikult vähe kontuure.  
(0-ile ei tohi valida 1-de kontuuridesse)
- Määramatuse ruute tohib seejuures kontuuridega katta, kuid ei pea katma.  
Määramatusei katame kontuuridega ainult siis, kui see aitab kasvatada veelgi suuremaks mõnda niikuinii vajalikku kontuuri.
- Kontuurid tohivad kattuda — peavad olema suurimad võimalikud.



$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

parim kontuuridevalik selle funktsiooni 1-de piirkonna jaoks:

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

MDNK väljakirjutamiseks analüüsime ühekaupa igat valitud kontuuri — suvalises järjekorras, üks kontuur korraga

kontuuri analüüsimisel tuvastame:

millised muutujad on konstantsed selle kontuuri ulatuses ?

ehk

millistes kaardipiirkondades asub see kontuur tervikuna ?



$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

Annotations:  $x_1 = 0$  (circled),  $x_2$  pole konstantne (dashed box),  $x_4$  pole konstantne (dashed box),  $x_3 = 1$  (circled).

konstantsed muutujad  
vaadeldavas kontuuris

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

Annotations:  $x_3 = 1$  (circled),  $\bar{x}_1 x_3$  (circled),  $x_1 = 0$  (circled).

1-de kontuurile vastav  
elementaarkonjunktsioon

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

1-de kontuuridele vastavad elementaarkonjunktsioonid

$$\bar{x}_1 x_3$$

$$\bar{x}_2 \bar{x}_4$$

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

osaliselt määratud funktsiooni MDNK-esituseks valitud täielikult määratud funktsioon

kaardilt väljakirjutatud MDNK:  $f(x_1 x_2 x_3 x_4) = \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4$

**Osaliselt määratud funktsioon on sellega "lõpuni määratud"**

kontuuride äravalimine toob endaga koheselt kaasa ka senise osaliselt määratud loogikafunktsiooni lõpunimääramise täielikult määratud funktsiooniks — ehk määramatuspiirkond saab ärajaotatud 1de ja 0de piirkonna vahel.



... aga kui oleks valitud 1de katmiseks 4ruudulise asemel väiksem kontuur? — ehk kui oleks valitud 2ruuduline kontuur?

... eelnevalt saadud MDNK oli:  $f = \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4$

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

ebaoptimaalsem kontuuridevalik 1de katmiseks

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

... selle kontuurivalikuga oleks esindajaks valitud selline täielikult määratud funktsioon

$f(x_1 x_2 x_3 x_4) = \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4$  esimene elementaarkonjunktsioon tuleb seljuhul teistsugune: uuest kontuuridevalikust väljakirjutatud DNK:

$$f(x_1 x_2 x_3 x_4) = \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4$$

väiksemas kontuuris on rohkem konstantseid muutujaid, mis põhjustab enamate liikmetega (ehk keerukamat) loogikaavaldist / normaalkuju.

... järelikult tasub valida SUURIMAD võimalikud kontuurid, misjuhul tuleb avaldisse VÄHIM arv algerme  $x_i$  ehk saame minimaalseima normaalkuju.



MDNK leitud ja analüüsitud — edasi leiame samale funktsioonile MKNK:

**! KNK saadakse alati loogikafunktsiooni 0de piirkonnast !**

MKNK leidmisel teeme kõik samad toimingud, kuid **duaalselt vastupidi**: katame suurimate võimalike kontuuridega 0-de piirkonna ehk 0-de ruudud:

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

esimesena märgatav kontuuridevalik

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

teine võimalik / sobiv kontuuridevalik

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

kolmas võimalik / sobiv kontuuridevalik

ükski 3st sobivast kontuuridevalikust pole ülejäänud kahe suhtes parem / pole eelistatud, kuna kõik nad kasutavad 3 tk 4-ruudulisi kontuure ehk kõik nad annavad sama keerukusega KNK (leidub 3 erinevat MKNK-d)

kirjutame MKNK välja esimesest (ehk kõige kergemini märgatavast) kontuuridevalikust:

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

esimesena märgatav kontuuridevalik

MKNK keerukus on soovikorral juba näha, sest kontuurid on juba valitud: kontuuride arvust ja nende suuruselt tulenevalt oleme saamas sellise keerukusega MKNK-d: (3 elementaardisjunktsiooniga, igas 2 algtermi):

**KNK** on (tehete mõttes) **duaalselt vastupidine** normaalkuju **DNK** suhtes :

$$\text{DNK: } \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4$$

$$f(x_1 x_2 x_3 x_4) = (x \vee x)(x \vee x)(x \vee x)$$

! tüüpiline viga:



**KNK** jaoks (ehk **0**-de kontuuridest) ei tekki *inversioonid* samamoodi nagu **DNK** jaoks (ehk nagu **1**-de kontuuridest);

**KNK** jaoks tekkivad *inversioonid* **duaalselt vastupidi** (DNK ehk **1**-de kontuuride suhtes) :

nullide kontuuris konstantne väärtus **1** annab **inversioonis** algtermi ;  
nullide kontuuris konstantne väärtus **0** annab **otseväärtes** algtermi ;

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

lahendiks valitud **MKNK** kontuuridekomplekt

$$f(x_1 x_2 x_3 x_4) = (\bar{x}_2 \vee x_3)(x \vee x)(x \vee x)$$

**MKNK:**

$$f(x_1 x_2 x_3 x_4) = (\bar{x}_2 \vee x_3)(x_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_4)$$

pane tähele :

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	$\bar{x}_3$	$x_3$	$\bar{x}_3$	
$x_1 \backslash x_2$	00	01	11	10
0				
1				

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	$\bar{x}_4$	$x_4$	$\bar{x}_4$	
$x_1 \backslash x_2$	00	01	11	10
0				
1				

piirkondade tähised on (algtermidena) õiged ainult **DNK** jaoks !



Eelmine tund leidsime **MDNK** ja **MKNK** ühele osaliselt määratud 4-muutuja loogikafunktsioonile.

Et saadud *normaalkujudele* saaks viidata, tähistame leitud **MDNK** ja **MKNK** :

$$f_K = (\bar{x}_2 \vee x_3)(x_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_4)$$

$$f_D = \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4$$

vaatleme, milleks arvutuvad leitud normaalkujud *määramatuspiirkonnas*.



milleks arvutub leitud **MDNK**

funktsiooni **määramatuspiirkonnas** : { 0011 1110 } ?

$$f_D(0011) = ?$$

$$f_D(1110) = ?$$

$$f_D(x_1 x_2 x_3 x_4) = \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4$$

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

$$f_D(0011) = 1$$

$$f_D(1110) = 0$$

leitud MKNK oli :

$$f_K = (\bar{x}_2 \vee x_3)(x_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_4)$$



milleks arvutub leitud MKNK

funktsiooni **määramatuspiirkonnas** : { 0011 1110 } ?

$$f_K(0011) = ?$$

$$f_K(1110) = ?$$

$$f_K(x_1 x_2 x_3 x_4) = (\bar{x}_2 \vee x_3)(x_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_4)$$

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	—
10	1	0	0	1

MKNK leidmise  
kontuuridevalik

$$f_K(0011) = 1$$

$$f_K(1110) = 1$$



kas leitud MDNK ja MKNK on teineteisega loogiliselt võrdsed ?

$$f_D = f_K ?$$

meenutame:

loogikaavaldised on **võrdsed** kui nende tõeväärtustabelid on samasugused.

Osaliselt määratud funktsiooni esindajateks valitud MDNK ja MKNK **võrdsus** oleneb sellest, milleks nad arvutuvad *määramatuspiirkonnas*.

Siin leitud mõlemad normaalkujud  $f_D$   $f_K$  **ei ole** teineteisega võrdsed:

$$f_D \neq f_K \quad \text{sest}$$

$$f_D(1110) \neq f_K(1110) \quad \text{kuid}$$

$$f_D(0011) = f_K(0011)$$


tõeväärtustabelite **elviimane** rida on neil erinev :

$$f_D(1110) = 0$$

$$f_K(1110) = 1$$

... järgnev tõeväärtustabel ei ole lahenduse osa — ainult illustratsioon :


$x_1 x_2 x_3 x_4$	$f_D$	$f_K$
0 0 0 0	1	1
0 0 0 1	0	0
0 0 1 0	1	1
0 0 1 1	1	1
0 1 0 0	0	0
0 1 0 1	0	0
0 1 1 0	1	1
0 1 1 1	1	1
1 0 0 0	1	1
1 0 0 1	0	0
1 0 1 0	1	1
1 0 1 1	0	0
1 1 0 0	0	0
1 1 0 1	0	0
1 1 1 0	0	1
1 1 1 1	0	0




sellel funktsioonil on täpselt 1 MDNK kuid 3 erinevat MKNK-d

kui oleksime valinud lahendiks mõne teise MKNK — kas seljuhul oleks leidunud ka selline MKNK, mis juhtumisi on võrdne sama funktsiooni MDNK-ga ? ( MDNK = MKNK ? )

vaatame kõigi nelja funktsiooni ( 1 MDNK + 3 MKNK ) tõeväärtustabeleid kaartidel :



MDNK jaoks parim "esindaja" :  
täielikult määratud loogikafunktsioon



MKNK jaoks meie valitud esindaja :  
täielikult määratud loogikafunktsioon

		$x_3x_4$		
$x_1x_2$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	1
10	1	0	0	1

MKNK jaoks **teine** võimalik esindaja :  
täielikult määratud loogikafunktsioon

		$x_3x_4$		
$x_1x_2$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1


MKNK jaoks **kolmas** esindaja:  
täielikult määratud loogikafunktsioon

ilmneb, et selle funktsiooni ükski **MKNK** ei ole juhtumisi võrdne **MDNK**-ga see pole probleem — nad ei peagi olema võrdsed; (küsisime uudishimust...)


ka kodutöös on vaja äratunda leitud MDNK ja MKNK avaldiste omavahelist **võrdsust** / mittevõrdsust !




pane tähele :



see 2 x 2 kontuur on tekkinud . . . .



. . . nende kontuuride kokkuliitmisel



. . . nende kontuuride kokkuliitmisel

või

ülesanne:



Leia **Karnaugh' kaardi** abil MDNK samale funktsioonile, mille TDNK lihtsustasime eelpool näites MDNK-ks

$x_1 x_2 x_3$	$f(x_1 x_2 x_3)$
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1



kanname tõeväärtustabeli 3-muutuja kaardile:

		$x_2x_3$		
$x_1$	00	01	11	10
0				
1				



$x_2x_3$		00	01	11	10
$x_1$	0	1	0	1	1
	1	0	1	1	1

$x_2x_3$		00	01	11	10
$x_1$	0	1	0	1	1
	1	0	1	1	1

MDNK :

$$f(x_1x_2x_3) = x_2 \vee x_1x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3$$

MDNK-ks saime siin sama tulemuse nagu enne TDNK teisendamisel:

... meenutame selle funktsiooni TDNK varasema teisenduse lõppu :

$$\begin{aligned} \dots &= \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_2(\bar{x}_1 \vee x_1) \vee x_1x_3 = \\ &= \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_2 \vee x_1x_3 \end{aligned}$$



? ... kas Karnaugh' kaardilt väljakirjutatud DNK-avaldist võib vahel olla võimalik lihtsustada käsitsi edasi veelgi lihtsamaks (loogikaalgebra põhiseoste abil) ?

(märgime : praegu kaardilt saadud DNK-d :  $x_2 \vee x_1x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3$  ei ole võimalik "käsitsi" edasi lihtsustada )



ainult seljuhul saab avaldist edasi lihtsustada :

vaatame milline oleks olnud kaardilt loetav DNK-avaldis, kui oleksime ühe kontuuri valinud väiksema ?

$x_2x_3$		00	01	11	10
$x_1$	0	1	0	1	1
	1	0	1	1	1

... sellisest kontuuridevalikust väljakirjutatud DNK :

$$f(x_1x_2x_3) = x_2 \vee x_1x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3$$

sellises avaldises leidub neeldumine  $x \vee \bar{x}y = x \vee y$

mis ikkagi kaotab liiase  $\bar{x}_2$

ülesanne:






Leida Karnaugh' kaardiga MDNK MKNK 5-muutuja funktsioonile:

$$f(x_1 \dots x_5) = \sum (0, 2, 6, 7, 8, 10, 24, 30)_1 \quad (3, 14, 16, 18, 26)_-$$



kanname tõeväärtustabeli 5-muutuja kaardile:

$$f(x_1 \dots x_5) = \sum (0, 2, 6, 7, 8, 10, 24, 30)_1 \quad (3, 14, 16, 18, 26)_-$$




**MDNK :**

$$f(x_1 \dots x_5) = \bar{x}_3 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_4 \vee x_2 x_4 \bar{x}_5$$

see on ainus MDNK sellel (osaliselt määratud) funktsioonil.

kogu määramatuspiirkond tasus võtta 1-de piirkonnaks

**MKNK :**



**MDNK** jaoks ainus parim kontuuridevalik :

... tundub ahvatlev 8-ruudune kontuur valida kohe esimesena ?...

$x_2x_3 \backslash x_4x_5$	00	01	11	10
00		0	—	
01	0	0		
11	0	0	0	—
10		0	0	

$x_2x_3 \backslash x_4x_5$	00	01	11	10
00	—	0	0	—
01	0	0	0	0
11	0	0	0	
10		0	0	—



vajalikud kontuurid (kui selliseid on?) valida esimesena ;


kindlat algoritmi parimate kontuuride väljavalmiseks pole :  
kontuuride valimine on heuristiline toiming :

$x_2x_3 \backslash x_4x_5$	00	01	11	10
00		0	—	
01	0	0		
11	0	0	0	—
10		0	0	

$x_1 = 0$

$x_2x_3 \backslash x_4x_5$	00	01	11	10
00	—	0	0	—
01	0	0	0	0
11	0	0	0	
10		0	0	—

$x_1 = 1$




$x_2x_3 \backslash x_4x_5$	00	01	11	10
00	1		—	1
01			1	1
11				—
10	1			1

$x_1 = 0$

$x_2x_3 \backslash x_4x_5$	00	01	11	10
00	—			—
01				
11				1
10	1			—

$x_1 = 1$



MKNK :

$$f(x_1 \dots x_5) = ( \quad ) ( \quad ) ( \quad ) ( \quad )$$

$$f(x_1 \dots x_5) = (\bar{x}_3 \vee x_4)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_5)(x_4 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee x_2)$$



siin leidub ka teine, sama keerukusega MKNK (seega on 2 lahendit)  
ruut 00001 on kaetav ka muu 8-ruudulise ehk samasuure kontuuriga :

$x_2x_3 \backslash x_4x_5$	00	01	11	10
00	1	0	—	1
01			1	1
11				—
10	1			1



$x_1 = 0$

$x_2x_3 \backslash x_4x_5$	00	01	11	10
00	—			—
01				
11				1
10	1			—

$x_1 = 1$



**miks ei saa parempoolset "kaardikorrusel" seda uut oranži kontuuri suurendada 8-ruuduliseks?** ( praegu on ta seal ju 4-ruuduline ja keskel ruutudes pole seal 1-sid segamas ? )



**pane tähele :** samal põhjusel ei saa "parempoolse tabeli punane kontuur" kasvada suuremaks ehk 8-ruuduliseks

ülesanne: -----



Kontrollida eelmise tunni ühe ülesande teisendustulemuseks olnud TDNK-avaldis

$$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$

... minimaalsust **Karnaugh' kaardi abil.**

meenutame :

seada TDNK-avaldist ei õnnestunud käsitsi enam edasi lihtsustada




selle DNK **minimaalsuse** kontrollimiseks saame kasutada *tõeväärtustabelit* mille varem arvutasime etteantud avaldisele  $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$  :

( või arvutame tema *tõeväärtustabeli* uuesti : )

$x_1 x_2 x_3$	$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$	TDNK liikmed
0 0 0	0	
0 0 1	1	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$
0 1 0	1	$\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$
0 1 1	0	
1 0 0	1	$x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$
1 0 1	0	
1 1 0	0	
1 1 1	1	$x_1 x_2 x_3$

**MDNK** väljakirjutamiseks kanname selle tõeväärtustabeli **3-muutuja Karnaugh' kaardile** :



$f :$

		$x_2x_3$			
	$x_1$	00	01	11	10
0		0	1	0	1
1		1	0	1	0

ilmneb, et selle funktsiooni **TDNK** on samas ka **MDNK** kuna ta ei lihtsustu :  
 1-de paigutus on väga ebasoodne: valida õnnestub ainult üheruudulisi kontuure :

$f :$

		$x_2x_3$			
	$x_1$	00	01	11	10
0		0	1	0	1
1		1	0	1	0

avaldis  $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$  **MDNK** kui ka **TDNK** on sama avaldis :

$$f(x_1x_2x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$$

ülesanne: -----



Kontrollida **Karnaugh' kaardiga** ühe varasema teisendusülesande tulemuseks saadud **DNK-avaldis** **minimaalsust**:

$$f(x_1 \dots x_4) = x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_3x_4 \vee x_2x_4 \vee \bar{x}_1x_4$$

Kas see DNK on **MDNK** ?



tegutseme "tagurpidi" senise suhtes :

kanname 4-muutuja kaardile need 1-de kontuurid, millest tuleneks antud DNK

$$x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_3x_4 \vee x_2x_4 \vee \bar{x}_1x_4$$

		$x_3x_4$			
	$x_1x_2$	00	01	11	10
00					
01					
11					
10					

- elementaarkonjunktsioon  $x_1\bar{x}_2\bar{x}_4$  tuleneb 1-de intervallist 1 0 — 0
- elementaarkonjunktsioon  $x_1\bar{x}_2x_3$  tuleneb 1-de intervallist 1 0 1 —
- elementaarkonjunktsioon  $x_3x_4$  tuleneb 1-de intervallist — — 1 1
- elementaarkonjunktsioon  $x_2x_4$  tuleneb 1-de intervallist — 1 — 1
- elementaarkonjunktsioon  $\bar{x}_1x_4$  tuleneb 1-de intervallist 0 — — 1

		$x_3x_4$			
	$x_1x_2$	00	01	11	10
00			1	1	
01			1	1	
11			1	1	
10		1		1	1

analüüsitava DNK tõeväärtustabel kaardil



? ... mitme kontuuriga õnnestub siin katta kõik 1-de ruudud optimaalseimal viisil (kui oleks eesmärgiks MDNK)?

$x_1x_2$	$x_3x_4$			
	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11		1	1	
10	1		1	1

algse DNK liikmetele vastavad 5 kontuuri

liiane kontuur vastab DNK liikmele  $x_1\bar{x}_2x_3$  :

$$x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_3x_4 \vee x_2x_4 \vee \bar{x}_1x_4$$

Selle liikme ärajätmisel DNK-st jääb avaldise tõeväärtustabel muutumatuks.

Analüüsitava DNK-avaldise MDNK on seega:

$$x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_3x_4 \vee x_2x_4 \vee \bar{x}_1x_4$$



mis põhjustab punase kontuuri liiasust ?

$x_1x_2$	$x_3x_4$			
	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11		1	1	
10	1		1	1

liigne kontuur on kaetud 2 muu kontuuri poolt

Kaardi kontuuridest on näha, et liiasus sisaldub juba liiasse avaldise kolmes esimeses liikmes :

$$x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_3x_4 \vee x_2x_4 \vee \bar{x}_1x_4$$

neljas liige  $x_2x_4$  ja viies liige  $\bar{x}_1x_4$  ei põhjusta teise liikme liiasust

$$x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_3x_4 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_3x_4$$



kas leidub ka avaldise teisendus, mis kaotaks liiasse liikme ?

**JAH LEIDUB selline teisendus !**

( ... ja osad õpilased vajavad seda ka oma kodutöös ) :

rakendades kleepimisseadust  $x = xy \vee x\bar{y}$  teisendame avaldise korraks keerulisemaks,

lisades liiasse liikmele mõne seal puuduva muutuja — siin:  $x_4$

$$\begin{aligned} & x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_3x_4 = \\ = & x_1\bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3x_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3\bar{x}_4 \vee x_3x_4 = \dots \end{aligned}$$

... nüüd on tekkinud avaldises neeldumised kujul  $x \vee xy = x$



{ 0001 0110 0011 1001 1101 1011 }

... tuvastame nende vektorite asukohad (ruudud) 4-muutuja kaardil :

$x_3x_4$ $x_1x_2$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$x_3x_4$ $x_1x_2$	00	01	11	10
00		0001	0011	
01				0110
11		1101		
10		1001	1011	

$x_3x_4$ $x_1x_2$	00	01	11	10
00		0001	0011	
01				0110
11		1101		
10		1001	1011	

neljane intervall : 1 tk

$x_3x_4$ $x_1x_2$	00	01	11	10
00		0001	0011	
01				0110
11		1101		
10		1001	1011	

kahesed intervallid: 5 tk

Kaardilt saab kohe välja kirjutada needsamad *intervallid* , mis varem leidsime vektorite võrdleval analüüsimisel :

ainus *neljane intervall* (ehk neljaruuduline *kontuur* kaardil) on :

— 0 — 1

*kaheseid intervalle* (ehk kahearuudulisi *kontuure*) paistab siin 5 tk :

$$\{ 0001 \ 0011 \} = 00 — 1$$

$$\{ 0001 \ 1001 \} = — 0 0 1$$

$$\{ 0011 \ 1011 \} = — 0 1 1$$

$$\{ 1001 \ 1101 \} = 1 — 0 1$$

$$\{ 1001 \ 1011 \} = 1 0 — 1$$

ülesanne:



Leida **Karnaugh' kaardiga** MDNK 6-muutuja funktsioonile:

$$f(x_1 \dots x_6) =$$

$$= \sum (0, 1, 16, 17, 46, 48, 49, 58, 59, 62, 63)_1 (32, 33, 36, 39, 44) —$$






### kanname tõeväärtustabeli 6-muutuja kaardile:


$x_5 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10				
00																				
01																				
11																				
10																				

$x_1 x_2 = 00$        $x_1 x_2 = 01$        $x_1 x_2 = 11$        $x_1 x_2 = 10$




$x_5 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10				
00	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			—	—			—	—		
01																			—	
11											<b>1</b>	<b>1</b>					—			<b>1</b>
10											<b>1</b>	<b>1</b>								

$x_1 x_2 = 00$        $x_1 x_2 = 01$        $x_1 x_2 = 11$        $x_1 x_2 = 10$



$x_5 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10				
00	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			—	—			—	—		
01																				
11											<b>1</b>	<b>1</b>								<b>1</b>
10											<b>1</b>	<b>1</b>								

$x_1 x_2 = 00$        $x_1 x_2 = 01$        $x_1 x_2 = 11$        $x_1 x_2 = 10$



### MDNK :

$$f(x_1 \dots x_6) = \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 x_3 x_5 \vee x_1 x_3 x_4 x_5 \bar{x}_6$$

ülesanne: ----- \



Leida Karnaugh' kaardi abil MDNK MKNK DNK-avaldisena esitatud 4-muutuja funktsioonile :

$$f(x_1 x_2 x_3 x_4) =$$

$$= x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_4 \vee \bar{x}_1 x_3 x_4 \vee x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 x_3 x_4$$



	$x_3x_4$	00	01	11	10
$x_1x_2$	00				
	01				
	11				
	10				

	$x_3x_4$	00	01	11	10
$x_1x_2$	00			1	
	01			1	
	11	1	1	1	
	10	1	1	1	

etteantud DNK tõeväärtustabel kaardil

... antud DNK-ga võrdne MDNK on:  $f = x_1\bar{x}_3 \vee x_3x_4$

ja võrdne MKNK on:  $f = (x_1 \vee x_3)(\bar{x}_3 \vee x_4)$

iseseisev vabatahtlik kodune lahendamise:



roheline õpiku (2012) lk. 231 viimane ül. lk. 232 esimene ül. :

$f = \sum (3, 4, 7, 12, 14)_1 (0, 5, 6, 8, 15)_-$  leida MDNK ja MKNK

$f = \sum (0, 1, 4, 9, 25, 28)_1 (5, 13)_-$  leida MDNK ja MKNK

ülesanne:



Leida TDNK TKNK MKNK 3-muutuja funktsioonile:

$$f(x_1x_2x_3) = \bar{x}_1 \vee x_2x_3$$



... miks siin ei küsita MDNK leidmist ?



mitu võimalust leida TDNK :

1. kleepimise (korduv) rakendamine mittetäielikule DNK-le ;

TDNK saamiseks võib lisada elementaarkonjunktsioonidele nendes puuduvad muutujad kleepimisseaduse korduva rakendamisega:

$$x = x\bar{y} \vee xy$$

$$\bar{x}_1 \vee x_2x_3 = \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_2 \vee x_2x_3 =$$

$$= \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1x_2x_3 =$$

$$= \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1x_2x_3$$

... lahendatud : TDNK leitud



... kas oleks saanud lisada samal kleepimissammul ühe asemel korraga 2 muutujat — ehk mõlemad puuduolevad :  $x_2$  ja  $x_3$  korraga ? (... misjuhul lisanduks korraga korrutis  $x_2 x_3$  ?)

ON VÕIMALIK , kuid mitte nii :

! viga:



$$\bar{x}_1 \neq \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$$

$$x = x y \vee x \bar{y}$$

õige teisenduskäik JUHUL KUI soovitakse kleepida "2 muutujat korraga" :

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 \vee x_2 x_3 &= \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \overline{x_2 x_3} \vee \\ &\vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 = \dots \\ &= \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \\ &\vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

saime sama TDNK — kuid "kaks muutujat korraga"-juurdekleepimisel osutus kogu teisendus TDNK-ni mahukamaks kui "üks muutuja korraga"-juurdekleepimisel

MKNK :

mitu võimalust leida MKNK :

- minna üle Karnaugh' kaardi abil selle funktsiooni 0-de piirkonnale ;
- mõtteliste sulgude (korduv) lahtiliitmine DNK-s viib avaldise samuti KNK-ks; (kuid mitte alati MKNK-ks)

1. MKNK leidmiseks tasub Karnaugh' kaardi abil tuvastada selle funktsiooni nullide piirkond.

Selleks taastame (algsest MDNK-st) 3-muutuja kaardile esmalt ühed :

$$\bar{x}_1 \vee x_2 x_3$$

f:

$x_2 x_3$ $x_1$	00	01	11	10
0				
1				

... 1-sid oli vaja selleks, tegelikult saada nendekaudu teada hoopis 0-llid :

f:

$x_2 x_3$ $x_1$	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0

		$x_2 x_3$			
	$x_1$	00	01	11	10
$f:$	0	1	1	1	1
	1	0	0	1	0

MKNK :

$$f = (\bar{x}_1 \vee x_2) (\bar{x}_1 \vee x_3)$$

.... lahendatud : MKNK leitud

2. mõtteliste sulgude *lahtiliitmine* , kasutades põhiseost :

$$x \vee (y z) = (x \vee y)(x \vee z)$$

$$\bar{x}_1 \vee x_2 x_3 = \dots$$

$$\dots = \bar{x}_1 \vee (x_2 x_3) = (\bar{x}_1 \vee x_2)(\bar{x}_1 \vee x_3)$$

TKNK ?

TKNK võimalik leida mitmel viisil:

1. lisame MKNK liikmetele puuduvad algtermid *kleepimisseadusega* :

$$x = (x \vee y)(x \vee \bar{y})$$

kleebime MKNK liikmetele *algterme* juurde :

$$\begin{aligned} f &= (\bar{x}_1 \vee x_2) (\bar{x}_1 \vee x_3) = \\ &= (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \end{aligned}$$

$$(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)$$

.... jättes korduva KNK-liikme ära :

TKNK :

$$f = (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)$$

.... lahendatud : TKNK leitud

2. teine võimalus TDNK või TKNK väljakirjutamiseks :

TKNK : "üheruudulised kontuurid" *Karnaugh' kaardil* 0-e katmas ;

TDNK : "üheruudulised kontuurid" *Karnaugh' kaardil* 1-sid katmas ;

kui on juba olemas selle funktsiooni tõeväärtustabel *Karnaugh' kaardil* , siis moodustame mõttelised üheruudulised kontuurid 0-e katma :

		$x_2 x_3$			
	$x_1$	00	01	11	10
$f:$	0	1	1	1	1
	1	0	0	1	0
		100	101		110

TKNK saamisvõimalus

**üheruudulise** kontuuri ulatuses on konstantsed **kõik** muutujad !  
(.... mis on selle ruudu 2ndkood ehk **argumentvektor** )

**suurimatest** kontuuridest saame **minimaalse** normaalkuju ;  
**väikseimatest** (ehk 1-ruudulistest) kontuuridest saame **täieliku** normaalkuju ;

$$f = (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)$$

0de piirkonna üksikutest ruutudest TKNK liikmete väljakirjutamine on sama nagu tõeväärtustabeli 0de piirkonna üksikutest ridadest TKNK väljakirjutamine : iga ruut annab avaldisse **kõik** muutujad: saame TKNK Kaardil võib ettekujutada väikseimaid ehk 1-ruudulisi kontuure, misjuhul iga selline 1-ruudune *kontuur* annaks TKNK ühe liikme.

... no ja varemleitud **TDNK** oleks kah olnud võimalik saada kaardilt, nn. *üheruudulistest kontuuridest* mis katavad kõik 1-d :

$$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3$$

$f:$


$x_2 x_3$	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0

TKNK saamisvõimalus

$f:$

$x_2 x_3$	00	01	11	10
0	1 000	1 001	1 011	1 010
1	0	0	1 111	0

TDNK saamisvõimalus



... seniste harj.tundide näidetele toetudes saad proovida kodutöö (paber)mustandil lahendada oma kodutöö esimese poole mitmeid ülesandeid ...